

2014/2015 sezonu içinde geçerli olacak olan; Yağlık Soyanın fire ve zayıat oranları Yönetim Kurulumuzun 21.04.2015 tarihli, Meclisimizin de 28.04.2015 tarihli toplantılarında görüşülmüş ve yapılan değerlendirmelerden sonra;

2014/2015 sezonu için Yağlık Soyanın fire ve zayıat oranlarının:

SOYA FASÜLYESİ TOHUMU:

A-Borsa teamüllerine uygun % 10–12 rutubetli normal miktarda yabancı madde ihtiva eden 100 kg Soya Fasulyesinin kontinü pres ve ekstraksiyonla işlenmesinde elde edilen ürünlerin miktarını aşağıdaki gibi tespit etti.

- |                |            |
|----------------|------------|
| 1- Hamyağ..... | (% 17-21 ) |
| 2- Küşpe.....  | (% 75-80 ) |
| 3- Zayıat..... | (% 3-6 )   |

B-Yukarıda belirtilen randımanlara tesir eden unsurlar şunlardır:

1. Rutubet, yaralı dane, yeşil ve siyah dane, yabancı maddeleri fazla olan Soya Fasulyesi tohumlarının işlenmesinde genellikle bütün randımanlar düşük, kayıp miktarı maksimum olur.
2. İşletmede ekipman ve bilgi noksanlığı var ise; küspede yağ kalır. Dolayısıyla ham yağ randımanı düşük olur.
3. Soya Fasulyesi tohumu depolarda fazla bekletildiği takdirde, vereceği fire ayrıca dikkate alınmalıdır.
4. Soya tohumu işlenmesinde yüksek proteinli küspe elde edilmek istendiğinde % 2–6 arasında kabuk ayrılabilir. Ayrılan kabuk yüzdesi oranında küspe yüzdesi azalır.